

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

BULLETIN TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DLP - 8 - 9 - 70 092884

ÉDITION DE LA STATION "NORD et PICARDIE" Arras - Tél. 21.04.21

(NORD - PAS-DE-CALAIS - SOMME - AISNE - OISE)

Régisseur de Recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, 13, Grand'Place - 62 - ARRAS

C.C.P. LILLE 5701-50

ABONNEMENT ANNUEL

25 F

N° 120

SEPTEMBRE 1970

## AVERTISSEMENTS

### CARPOCAPSE DES FRUITS A PEPINS

Des chrysalides, en nombre relativement réduit ont pu se nymphoser. A la date du 13 Août, on enregistrait déjà quelques éclosions. Ces dernières se sont poursuivies durant la fin de la deuxième décade du mois et devraient encore se poursuivre. On pourrait en secteurs chauds observer des éclosions du début du mois jusqu'au 15 Septembre avec un maximum, en milieu de période.

Un traitement peut donc s'imposer dans les situations habituellement chaudes et prédisposées aux attaques de ce ravageur.

### CAPUA RETICULANA (Tordeuse de la pelure)

Les éclosions ont commencé à se produire à la fin du mois d'Août. Vu le retard pris par la première génération de ce papillon, les éclosions risquent d'être échelonnées. Si un traitement n'a pas été effectué dans les derniers jours d'Août, premiers jours de Septembre, se tenir prêt à intervenir si besoin ait. De toute façon, en secteur infesté, un traitement semble plus que judicieux. Surveiller attentivement les fruits pour déceler les premières morsures et intervenir aussitôt. Choisir un insecticide dans la gamme déjà citée.

### CONSERVATION DES FRUITS

Lors de la publication de l'article sur les maladies de conservation des fruits, dans l'avis d'Août 1970, nous avons parlé du trempage des fruits dans une solution d'éthoxyquine. Nous rappelons aux arboriculteurs que cette méthode donne d'excellents résultats mais NE VISE QUE L'ECHAUDURE ou SCALD DES POMMES ET DES POIRES, lors de la conservation des fruits en atmosphère contrôlée ou sous l'action du froid.

### TAVELURE DES ARBRES FRUITIERS A PEPINS

Se montrer très vigilant en cette période et jusqu'à la récolte. Les attaques tardives de Tavelure sont toujours très préjudiciables à la récolte ainsi qu'aux rameaux.

### TEIGNE DU POIREAU

### CULTURES LÉGUMIÈRES

Les chenilles de ce papillon peuvent encore commettre de gros dégâts dans les cultures surtout celles qui jusqu'alors n'ont encore subi aucun traitement. Se référer à la liste des produits homologués pour les cultures légumières.

### ROUILLE DU POIREAU

Dans le courant de Septembre, on peut rencontrer cette maladie au cours de périodes humides et douces, voire fraîches. On peut en limiter son extension en appliquant des traitements par pulvérisation à base de manèbe 150 g/hl. Propinèbe et Mancozèbe.

### SCLEROTINIA DE L'ENDIVE

Le moment est venu de commencer l'arrachage des carottes. Lors du stockage des collets, pratiquer un poudrage avant le recouvrement de terre avec du Quintozène à raison de 10 g de matière active au m<sup>2</sup>. L'emploi de dichloran peut aussi se concevoir.

### MOUCHE DE L'ENDIVE

Pratiquer au moment de la mise en couche, une pulvérisation sur les collets avec un produit à base de Diméthoate ou Trichlorfon.

L'Inspecteur du Service de la  
Protection des Végétaux  
P. COUTURIER

D. MORIN  
Le Contrôleur chargé des  
Avertissements, Agricoles  
G. CONCE